



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació



ESTACIÓ D'AVISOS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL INFORMADOR AUTOMÀTIC DE MÓRA D'EBRE

Avís del dia: 25 de juny de 2025

Avís 14/2025

Cultius:

Vinya, Fruïters, Perera i Pomera, Olivera, Cirerer, Ametller, Presseguer i Nectarina, i Parcs, Jardins i Espais Verds

ACTUACIONS EN PARCEL·LES ABANDONADES

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc per les plantacions veïnes.

El Decret 137/2014, de 7 d'octubre, en el seu article 6.1 indica que *"Les plantacions de conreus llenyosos tenen consideració de conreu abandonat si en els darrers dos anys no s'hi ha practicat operacions de conreu"*. L'article 6.2 estableix que *"és obligatòria l'arrencada i destrucció dels conreus, plantacions, collites i material vegetal que constitueixi un risc fitosanitari greu"*.

Demaneu la col·laboració per a la identificació de les parcel·les que es puguin considerar abandonades i que contacteu amb els Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l'Ebre.

Vinya

Míldiu

Les altes temperatures i la manca de pluges que estem tenint des de fa unes setmanes, fa que el risc d'atac de Míldiu sigui baix. Per aquest motiu no es recomana realitzar cap tractament.

Cendrosa

Us recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol. Les condicions actuals afavoreixen la malaltia. En cas d'aplicar sofre en pols, cal tenir en compte que a partir de 32°C de temperatura es poden provocar cremades.

Cuc del raïm (*Lobesia botrana*)

A les zones primerenques de la Terra Alta, l'inici d'eclosió és dijous 26, divendres 27 i dissabte 28 de juny.

A les zones mitjanes de la Terra Alta, l'inici d'eclosió és dissabte 28, diumenge 29 i dilluns 30 de juny.

A les zones tardanes de la Terra Alta, s'ha iniciat el període de posta.

Els productes recomanats per al seu control tenen els següents moments d'aplicació:

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	(E,Z) -7,9-dodecadien-1-il-acetat (Feromona líquida*,**)
Entre l'inici del vol i l'inici de l'eclosió	Clorantraniliprol
	Cyantraniliprol
Inici de l'eclosió	Bacillus thuringiensis **
	Spinosad**
	Tebufenocide

* Cal aplicar des de l'inici del vol de la 1a generació fins a la verema

** Autoritzat en agricultura ecològica

Hi ha alguns piretroids autoritzats en vinya, però no recomanats, per ser afavoridors d'àcars.

Fruiters

Mosca de la fruita (*Ceratitis capitata*)

Les captures de *Ceratitis capitata* han augmentat en els punts de control. Es recomana anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

Perera i Pomera

Psil·la

S'aconsella revisar les plantacions i tractar quan hi hagi més del 10% de brots amb ous i larves.

Olivera

Repilo

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser favorables per al desenvolupament de la malaltia, es recomana protegir les plantacions i si es veuen lesions de Repilo a la vostra finca cal que repetiu el tractament cada 4 - 5 setmanes. Si plou més de 15 - 20 litres/m² s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

Prays

De manera general està essent una campanya amb elevades poblacions de Prays, vigileu el cultiu.

A les zones mitjanes i tardanes de la Terra Alta, ja es va recomanar el seu control amb producte larvícida.

Piral o barrinador de la rama (*Euzophera pinguis*)

Si hi ha símptomes (galeries en la base de les rames de més de tres anys que ocasionen el debilitament d'aquestes) és el moment de fer el tractament. Cal dirigir el tractament a la fusta (punts d'inserció de rames, talls de poda, punt de l'empelt, berrugues). És millor fer el tractament amb pistola. Cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a Tuberculosis.

Cirerer

Drosophila Suzukii

Es recomana anar protegint tota cirera susceptible a ser picada, és a dir, a partir d'inici de maduració (color palla).

Cal tenir present que la cirera que no es cull i queda a l'arbre pot ser un focus d'infecció.

Ametller

Pugó verd

Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en brots tendres.

Brot sec (*Fusicoccum*)

En cas d'altres humitats o pluges durant el mes de juny, cal protegir les varietats sensibles a les finques on l'any passat va haver-hi afectació.

Presseguer i Nectarina

Anarsia

Es recomana protegir les plantacions amb arbres en formació per tal d'evitar el despuntat de les guies. A la vegada, en els llocs on habitualment ocasiona problemes es recomana tractar les finques amb plantacions adultes, per tal de fer baixar els nivells de població.

Pugó Verd

En cas d'observar reinfeccions de pugó en alguna plantació, es recomana renovar la protecció. Cal aplicar matèries actives de famílies diferents a les utilitzades en anterioritat per minimitzar els problemes de resistències.

Cendrosa - Monilia

Per tal d'evitar danys a la fruita cal mantenir protegides les varietats sensibles fins l'enduriment de pinyol.

Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina.

Parcs, Jardins i Espais Verds

Morrut de les Palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Amb l'augment de les temperatures augmenta el vol de la plaga i la colonització de noves palmeres. Fins al mes de novembre hi haurà activitat de la plaga. Durant aquest període, no convé fer treballs de poda ja que les ferides poden ser un atraient de la plaga. Cal continuar observant si hi ha símptomes sospitosos. Les palmeres afectades per la plaga que han mort, les que es consideri que no es poden salvar, i les restes afectades procedents de sanejaments, es recomana destruir-les i dur-les als punts establerts per gestionar-les adequadament. En zones afectades, es recomana aplicar tractaments preventius amb productes fitosanitaris.

Informació facilitada per l'informador automàtic de Móra d'Ebre (977 40 14 66)

Plaça Democràcia, s/n. 43740 Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 00 24 ssv.te.daam@gencat.cat <http://www.gencat.cat/daam>

Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

twitter.com/agriculturacat

facebook.com/agriculturacat