



Estació d'avís del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 27 de juny de 2025

Avís 36/2025

Cultius:

Vinya, olivera, avellaner, ametller, noguer, fruiters, cítrics, cirerer i horta

Vinya

Cuc del raïm

Moments de tractament i productes:

Abans de l'inici de vol	Feromona líquida
Entre inici de vol i inici eclosió	Clorantraniliprol Cyantraniliprol
Inici eclosió	<i>Bacillus thuringiensis</i> Spinosad Tebufenocide

- **Baix Penedès:**
 - **A la zona més primerenca i la zona d'interior** ja s'ha donat l'avís.
- **Camp de Tarragona:**
 - **A la zona primerenca i zones mitjanes** ja s'ha donat l'avís.
 - **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Aiguamúrcia, Rodonyà (Montferri), i Masllorenç, l'inici d'eclosió serà dijous 26, divendres 27 i dissabte 28.
 - **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, les Destres, les Pobles i les Planes de Cabra estem en període de posta.
- **Priorat DO Montsant:**
 - **A les zones primerenques i zones mitjanes** ja s'ha donat l'avís.
 - **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal l'inici d'eclosió serà divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29.
 - **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins l'inici d'eclosió serà dissabte 28, diumenge 29 i dilluns 30.
- **Priorat DOQ Priorat**
 - **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar ja s'ha donat l'avís.
 - **A la zona mitjana** de Gratallops, Vilella Alta i Baixa, i Torroja, l'inici d'eclosió serà divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29.
 - **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i els masos de Falset limítrof amb Porrera estem en període de posta.
- **Conca de Barberà:**
 - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà l'inici d'eclosió serà dijous 26, divendres 27 i dissabte 28.
 - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarraí l'inici d'eclosió serà dissabte 28, diumenge 29 i dilluns 30.

– **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarra, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat la posta.

Mosquit verd



S'estan detectant poblacions importants a alguns punts de la zona primerenca i mitjana del camp de Tarragona, amb els primers símptomes visibles en fulla (principalment en les de les puntes dels sarments). Vigileu les vostres plantacions, i en cas de detectar símptomes o presència abundant de la plaga, contacteu amb el vostre tècnic.

Cendrosa

Us recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol. Les condicions actuals afavoreixen la malaltia. Es preveu estabilitat i temperatures elevades pels propers dies.

Olivera

Prays oleae

De manera general està essent una campanya amb elevades poblacions de prays, vigileu el cultiu.

A les comarques del Baix Camp, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès i Priorat ja es va donar l'avís.

Avellaner

Cendrosa (*Erysiphe sp.*):

Cal continuar vigilant les plantacions afectades i mantenir el cultiu protegit.

Bernats

En aquelles finques que es detecti població, es recomana realitzar un tractament localitzat als arbres de les voreres que toquen als marges, basses o construccions. Recordem que els bernats encara no estan distribuïts a l'interior de les finques, per això no és el moment de fer un tractament generalitzat.

Zeuzera

En aquelles finques amb nivells alts de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, es recomana fer un tractament a partir del 23 al 29 de juny.

Ametller

Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

Ametller i avellaner

Aranya

Amb la pujada de temperatures, esteu atents per detectar els primers símptomes a les plantacions.

Fruiters i cítrics

Mosca de la Fruita (*Ceratitis capitata*)

Seguim tenint captures. Es recomana anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

És molt important retirar i/o passar la picadora a la fruita que pugui quedar a camp, per evitar fer reservori de plaga.

Fruiters

Anarsia i grafolita

Es recomana protegir les plantacions amb arbres en formació per tal d'evitar el despuntat de les guies. A la vegada, en els llocs on habitualment ocasiona problemes es recomana tractar les finques amb plantacions adultes, per tal de fer baixar els nivells de població.

Pugó verd

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

Trips

Només cal protegir aquelles varietats sensibles de nectarina.

Cirerer

Drosophila suzukii

Es segueixen tenint captures d'aquesta plaga en els punts de control. Es recomana anar protegint la cirera susceptible de ser picada, és a dir, a partir d'inici de maduració.

Horta

Horta en general

Pugó

Es segueixen detectant en diferents cultius.

Una bona eina per lluitar contra aquest insecte és la conservació dels enemics naturals, per aquest motiu s'aconsella l'ús de bandes florals per tal d'atraure'ls.

Fongs

Les humitats elevades i persistents afavoreixen les malalties, per la qual cosa, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits. Evitar fer plantacions denses per millorar la ventilació i procurar un bon drenatge del terreny, pot ajudar-nos a prevenir les malalties.

Tomaquera

Tuta absoluta

A l'aire lliure les poblacions són baixes però van augmentant, estigueu atents per tal de detectar els primers danys.

En hivernacle recordeu que la introducció de mírids depredadors pot fer un bon control de la plaga a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca.

L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes també ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trapes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

Es recomana utilitzar les matèries actives que tinguin un menor impacte sobre la fauna auxiliar.

Àcar del bronzejat

Amb l'augment de les temperatures apareix aquest àcar, generalment, a la part inferior de la tija i a les primeres fulles, prop de la superfície del sòl, i, progressivament, evoluciona de manera ascendent per tota la planta. Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Patata

Escarabat de la patata

Es segueixen trobant escarabats i larves als camps.

El període crític de defoliació de la patata per part de l'escarabat és tot just abans i després de la floració. En aquest període, la pèrdua de les fulles afecta greument la collita. Cal fer el tractament quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult).

Actuacions en parcel·les abandonades

La Llei 43/2002 de sanitat vegetal estableix l'obligació d'arrencar les plantacions abandonades quan constitueixin un risc fitosanitari per les plantacions veïnes.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

agricultura.sttgn.agricultura@gencat.cat